

# SKRIPSI

## SUPLEMENTASI LESITIN TERHADAP BERAT KARKAS DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM PEDAGING JANTAN



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Oleh :

**ADEX FAIZAL ROCHIEH**  
**SITUBONDO - JAWA TIMUR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**2000**

**SKRIPSI**

**SUPLEMENTASI LESITIN TERHADAP BERAT KARKAS  
DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM PEDAGING JANTAN**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Oleh :


**ADEX FAIZAL ROCHIE**

**NIM. 069312027**

Mernyetujui

Komisi Pembimbing,


  
**Dr. A. T. Soelih E., Drh.**  
**Pembimbing Pertama**

  
**Herman Setyono, M. S. Drh.**  
**Pembimbing Kedua**


Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh –sungguh kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar **SARJANA KEDOKTERAN HEWAN**.

Menyetujui,

Panitia Penguji;



**Mirni Lamid., M.P., Drh.**  
Sekretaris



**Setyawati Sigit., M.S., Drh.**  
Ketua



**Kuncoro Puguh S., M.Kes., Drh.**  
Anggota



**Dr. A. T. Soelih E., Drh.**  
Anggota




**Herman Setyono., M.S., Drh.**  
Anggota

Surabaya, 21 Desember 2000

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



**Dr. Ismudiono., M.S., Drh.**  
NIP. 80687297

## **SUPLEMENTASI LESITIN TERHADAP BERAT KARKAS DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM PEDAGING JANTAN**

**ADEX FAIZAL ROCHIE**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi lesitin terhadap berat karkas dan lemak abdominal dari ayam pedaging jantan.

Hewan percobaan yang digunakan adalah 24 ekor ayam pedaging jantan Strain Hubbard umur empat minggu. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan enam ulangan. Hewan percobaan ditempatkan secara individual pada kandang baterai. Perlakuan suplementasi lesitin melalui pakan basal atau pakan komersil pada fase finisher dengan dosis 0%, 0,7%, 2,5% dan 4,3%. Perlakuan diberikan pada saat ayam berumur empat minggu sampai enam minggu. Pengambilan data berupa berat karkas dan berat lemak abdominal dilakukan pada akhir minggu keenam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi lesitin hingga dosis 4,3% tidak mempengaruhi berat karkas dan lemak abdominal ayam pedaging jantan.